



Dr Łukasz Wohadlo

Chirurg Onkolog

PLASTYKA WAŁÓW PAZNOKCIOWYCH

INFORMACJE I PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Farmakologia:

- w związku z planowanym zabiegiem na tkankach miękkich zaleca się przyjmowanie antybiotyku Doxycyclinum* 100mg
- przyjmowanie antybiotyku należy rozpocząć w dniu zabiegu
- dawkowanie 2 razy dziennie (rano i wieczorem) po jednej tabletkie przez pięć dni
- podczas przyjmowania antybiotyku zaleca się stosowanie leków osłonowych (probiotyków)
- w przypadku osób niepełnoletnich o dawce antybiotyku decyduje lekarz
- w nietolerancji na Doxycyclinum stosowanie antybiotykoterapii należy ustalić indywidualnie

Przygotowanie palca:

- dzień przed planowanym zabiegiem oraz w dniu zabiegu konieczne jest moczenie stopy/stóp przez 10 minut w przygotowanym wcześniej roztworze nadmanganianu potasu
- roztwór powinien być słaby (bladoróżowy, nie fioletowy)
- pozostawić do wyschnięcia

OPIS ZABIEGU

- Podczas zabiegu usuwany jest nadmiar/przerost wałów okołopaznokciowych lub przerost guzowatości paznokciowej palucha/paluchów, co wiąże się z założeniem szwów skórnych. Szwy usuwane są po 14 dniach.
- W czasie noszenia szwów nie należy moczyć stóp.

ZALECENIA POZABIEGOWE

- pierwszy opatrunek zmienia się po trzech dobach od zabiegu; w przypadku, gdy opatrunek przywarł do rany, każdą warstwę moczymy obficie MICRODACINE 60 WOUND CARE
- Nie zezwala się na stosowanie preparatu OCTENISEPT.
- wycieramy jałowym gazikiem
- na ranę nakładamy gazik jałowy nasączony Braunovidon/Betadine maść lub Prontosan acute żel na rany
- nakładamy kolejny jałowy gazik i zawijamy lekko bandażem
- opatrunek należy zmieniać co 24 godziny według powyższej instrukcji (bandaż można zastąpić siateczką Codotex/Codofix*** rozmiar 2)
- po 14 dniach Pacjent zgłasza się na usunięcie szwów
- trzy doby po usunięciu szwów zaleca się kontynuowanie opatrunków z Braunovidon/Betadine maść lub Prontosan acute żel na rany, jeżeli nie zostaną przekazane inne zalecenia.

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ KLAPKI !!